Correction du contrôle continu 1

Exercice 1. On considère la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant $u_0 = 1$ et la relation de récurrence suivante: pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 3}.$$

1. Calculer les valeurs de u_1 et u_2 .
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2^n}{2 \cdot 3^n - 2^n}$.

.....

1. On utilise la relation de récurrence pour $n = 0$: $u_1 = \frac{2u_0}{u_0 + 3} = \frac{2 \cdot 1}{1 + 3} = \frac{1}{2}$.

De même la relation de récurrence pour $n = 1$ donne, $u_2 = \frac{2u_1}{u_1 + 3} = \frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 3} = \frac{1}{\frac{7}{2}} = \frac{2}{7}$.

2. Initialisation: La propriété à démontrer est vérifiée pour $n = 0$, en effet :

$$\frac{2^0}{2 \cdot 3^0 - 2^0} = \frac{1}{2 \cdot 1 - 1} = 1 = u_0.$$

Hérédité: Supposons que la propriété soit vérifiée au rang n . On va alors calculer u_{n+1} en utilisant la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 3} = \frac{2 \cdot \frac{2^n}{2 \cdot 3^n - 2^n}}{\frac{2^n}{2 \cdot 3^n - 2^n} + 3} = \frac{2 \cdot 2^n}{2^n + 3(2 \cdot 3^n - 2^n)} = \frac{2^{n+1}}{2 \cdot 3^{n+1} - 2 \cdot 2^n} = \frac{2^{n+1}}{2 \cdot 3^{n+1} - 2^{n+1}},$$

ce qui est bien la propriété voulue au rang $n + 1$.

Donc, par le principe de récurrence, la propriété est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2. On considère deux applications f et g , d'ensemble de départ $]0, +\infty[$ et d'ensemble d'arrivée $]0, +\infty[$, définies pour tout $x > 0$ par

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{1}{x}.$$

1. Calculer l'application composée $f \circ g$. En déduire que f n'est pas injective.
2. Etudier le sens de variation de la fonction f et tracer approximativement son graphe.
3. Déterminer les ensembles $f(]0, 1])$ et $f(] \frac{1}{2}, 2[)$.
4. Soit $y \in]0, +\infty[$ quelconque. Décrire $f^{-1}(\{y\})$. On pourra montrer que la condition $x \in f^{-1}(\{y\})$ se ramène à une équation du second degré en x .
5. Soit $h :]0, 1] \rightarrow [2, +\infty[$ l'application définie par $h(x) = f(x)$ pour $x \in]0, 1]$. Démontrer que h est une bijection et décrire son application réciproque.

.....

1. Pour tout $x \in]0, +\infty[$, on a $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} + x = f(x)$, ce qui montre que $f \circ g = f$ car $f \circ g$ et f ont mêmes ensembles de départ et d'arrivée.

Pour tout $x_1 \in]0, +\infty[$, posons $x_2 = g(x_1) = \frac{1}{x_1}$. Par le calcul précédent $f(x_2) = f(x_1)$. En particulier pour $x_1 = 2$ on obtient $f(2) = f(1/2)$. Par conséquent f n'est pas injective.

2. Il est clair que f est dérivable sur $]0, +\infty[$. On étudie le signe de $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$:

$$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 \geq \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow x^2 \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 1 \quad (\text{car } x \text{ est positif}).$$

On calcule également $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $f(1) = 2$ pour aboutir au tableau de variations suivant :

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	2	$+\infty$

On en déduit un graphe approximatif de f :

3. Au vu des variations de f et puisque $f(1) = 2$, $f(2) = f(1/2) = \frac{5}{2}$, on "voit" que $f(]0, 1]) = \{f(x) | x \in]0, 1]\} = [2, +\infty[$ et $f(] \frac{1}{2}, 2]) = \{f(x) | x \in] \frac{1}{2}, 2]\} = [2, \frac{5}{2}]$.

Pour justifier précisément la première égalité, on peut invoquer le fait que f est continue et décroissante sur $]0, 1]$, avec $f(1) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$:

On obtient ainsi que si $x \leq 1$, alors $f(x) \geq f(1) = 2$, ce qui donne que $f(]0, 1]) \subset [2, +\infty[$. Pour avoir l'inclusion dans l'autre sens, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires (f prend la valeur 2 en $x = 1$ et des valeurs aussi grandes que l'on veut lorsque x tend vers 0, comme f est continue toute valeur entre 2 et $+\infty$ est aussi dans l'image de $]0, 1]$).

On peut montrer de manière similaire que $f(] \frac{1}{2}, 2]) = [2, \frac{5}{2}]$ en utilisant la continuité, la décroissance de f sur $] \frac{1}{2}, 1]$ et sa croissance sur $]1, 2]$.

4. Par définition $f^{-1}(\{y\}) = \{x \in]0, +\infty[, f(x) = y\}$. Pour tout $x \in]1, +\infty[$ on a

$$f(x) = y \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} = y \Leftrightarrow x^2 - yx + 1 = 0.$$

Le discriminant de cette équation du second degré (en x) vaut $\Delta = y^2 - 4$.

- Pour $y < 2$, $\Delta < 0$ et l'équation n'a pas de solution et $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$.
- Pour $y = 2$, l'équation a une unique solution $x = -\frac{-y}{2} = 1$. $f^{-1}(\{2\}) = \{1\}$.
- Pour $y > 2$, l'équation a deux solutions distinctes et on obtient

$$f^{-1}(\{y\}) = \left\{ \frac{y + \sqrt{y^2 - 4}}{2}, \frac{y - \sqrt{y^2 - 4}}{2} \right\}.$$

5. Pour tout $y \in [2, +\infty[$ et $x \in]0, 1]$,

$$h(x) = y \Leftrightarrow x = \frac{y - \sqrt{y^2 - 4}}{2}.$$

En effet on obtient la même équation du second degré déjà résolue à la question précédente, dans son cas $\Delta \geq 0$ puisque $y \geq 2$. Si $y = 2$ la seule solution est $x = 1 = \frac{y - \sqrt{y^2 - 4}}{2}$. Si $y > 2$, la solution $\frac{y + \sqrt{y^2 - 4}}{2} > \frac{y}{2} > 1$ est éliminée car elle n'est pas dans $]0, 1]$ (ensemble de départ de h). On vérifie bien en revanche que pour tout $y \in [2, +\infty[$, $\frac{y - \sqrt{y^2 - 4}}{2} \in]0, 1]$. Ceci montre bien que h est bijective d'application réciproque

$$h^{-1} : [2, +\infty[\rightarrow]0, 1]$$

$$y \mapsto \frac{y - \sqrt{y^2 - 4}}{2}.$$

Exercice 3. Soit $f : E \rightarrow F$ une application entre ensembles finis. On considère l'énoncé P suivant:

$$(\text{card}(E) < \text{card}(F)) \implies (\exists y \in F, \forall x \in E, y \neq f(x))$$

1. Énoncer la contraposée de P
2. L'énoncé P est-il vrai pour toutes les applications, ou pour certaines? Pourquoi?

1. La contraposée de $A \implies B$ est $\text{non}B \implies \text{non}A$. Voici donc la contraposée de P :

$$\text{non}(\exists y \in F, \forall x \in E, y \neq f(x)) \implies \text{non}(\text{card}(E) < \text{card}(F)),$$

c'est à dire

$$(\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)) \implies (\text{card}(E) \geq \text{card}(F)).$$

2. La contraposée de P est exactement

$$f \text{ surjective} \implies (\text{card}(E) \geq \text{card}(F)).$$

Cette propriété est vraie pour toute application $f : E \rightarrow F$: on applique le point (3) du Théorème 2.2.5 du cours. Donc P est vraie pour toute application f

Exercice 4. Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

1. Donnez une définition mathématique précise de la propriété " f est injective "
2. Décrivez explicitement toutes les applications injectives de $\{1, 2\}$ à valeurs dans $\{1, 2, 3\}$, puis toutes les applications surjectives de $\{1, 2\}$ à valeurs dans $\{1, 2, 3\}$.
3. On suppose que E et F sont finis et on note $m = \text{card}(E)$ et $n = \text{card}(F)$. Combien y a-t-il d'applications de E dans F , combien parmi ces applications sont injectives? Faites l'application numérique pour $m = 4$ et $n = 6$.
4. Soient $A, B \subset E$, montrez par double inclusion que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Quelle relation est toujours vraie entre $f(A \cap B)$ et $f(A) \cap f(B)$? Démontrez-la.

.....

1. f est injective si et seulement si $\forall x \in E, \forall y \in E, (f(x) = f(y)) \implies (x = y)$.
 On peut aussi dire : f est injective si et seulement si $\forall x \in F, \text{card}(f^{-1}(\{x\})) \leq 1$, ce qui signifie que tout élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent.

2. Il y a six injections possibles de $\{1, 2\}$ à valeurs dans $\{1, 2, 3\}$. On les note ici $f_1, f_2, \dots, f_6$. Elles sont définies par:

$$\begin{array}{lll} f_1(1) = 1 \text{ et } f_1(2) = 2. & f_2(1) = 1 \text{ et } f_2(2) = 3. & f_3(1) = 2 \text{ et } f_3(2) = 3. \\ f_4(1) = 2 \text{ et } f_4(2) = 1. & f_5(1) = 3 \text{ et } f_5(2) = 1. & f_6(1) = 3 \text{ et } f_6(2) = 2. \end{array}$$

Comme $\text{card}\{1, 2, 3\} > \text{card}\{1, 2\}$, il n'y a pas d'application surjective de $\{1, 2\}$ à valeurs dans $\{1, 2, 3\}$.

3. D'après des résultats du cours : il y a n^m applications de E dans F , parmi lesquelles $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1) \cdots (n-m+1) = \prod_{k=n-m+1}^{k=n} k$ sont injectives.
 Pour $m = 4$ et $n = 6$, $6^4 = 1296$, $A_6^4 = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$.

4. Supposons que $x \in f(A \cup B)$. Alors il existe $y \in A \cup B$ tel que $x = f(y)$. Puisque $y \in A \cup B$, on a $y \in A$ ou $y \in B$. Si $y \in A$, alors $x \in f(A) \subset f(A) \cup f(B)$. Si $y \in B$, alors $x \in f(B) \subset f(A) \cup f(B)$. Donc dans tous les cas $x \in f(A) \cup f(B)$. Donc $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$.

Réciproquement, si $x \in f(A) \cup f(B)$, alors $x \in f(A)$ ou $x \in f(B)$. Si $x \in f(A)$, il existe $y \in A$ tel que $x = f(y)$, en particulier $y \in A \cup B$, donc $x \in f(A \cup B)$. Si $x \in f(B)$, il existe $y \in B$ tel que $x = f(y)$, en particulier $y \in A \cup B$, donc $x \in f(A \cup B)$. Donc dans tous les cas $x \in f(A \cup B)$. Donc $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$.

Par double inclusion, on peut conclure que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

On a toujours $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. En effet, si $x \in f(A \cap B)$, alors il existe $y \in A \cap B$ tel que $x = f(y)$. Puisque $y \in A \cap B$, on a $y \in A$ et $y \in B$. Puisque $y \in A$, alors $x \in f(A)$. Puisque $y \in B$, alors $x \in f(B)$. Donc $x \in f(A) \cap f(B)$.

Remarque: il n'est pas vrai en général que $f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$. Par exemple pour $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0\}$ définie par $f(0) = f(1) = 0$, si l'on pose $A = \{0\}$ et $B = \{1\}$ on a $f(A) \cap f(B) = \{0\}$ et $f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$.